

Un estimado de 2.000 mujeres embarazadas habrían contraído el virus del Zika en el país

Profamilia hace un llamado a fortalecer la anticoncepción frente al riesgo del Zika

- *El uso de métodos anticonceptivos de manera adecuada puede prevenir embarazos frente al riesgo del Zika, y así contribuir a mitigar los posibles riesgos de esta situación que se constituye en un problema de salud pública.*
- *Se registran alrededor de 20.000 casos de Zika en el país de los cuales casi 2.000 corresponden a mujeres en estado de gestación en Colombia.*
- *Es importante intensificar las campañas informativas, así como suministrar métodos anticonceptivos a la población colombiana.*
- *Las mujeres gestantes que tengan el virus del Zika tienen derecho a conocer sus opciones y decidir si continúan o no con el embarazo.*

De acuerdo con el panorama que se registra en el país con relación al virus del Zika y los posibles efectos que podría llegar a causar en mujeres gestantes, Profamilia hace un llamado a la población colombiana, a informarse y adoptar el uso adecuado de métodos anticonceptivos.

Juan Carlos Vargas – Gerente de Investigaciones de Profamilia – señala que “Las parejas deben adoptar un método de planificación, que les permita disfrutar de una sexualidad libre de riesgos, prevenir embarazos no planeados y mitigar el riesgo que representa el virus del Zika, que a la fecha registra 11.712 casos en el territorio nacional.

La decisión de utilizar un método anticonceptivo debe hacerse de manera libre e informada, en Profamilia existe el servicio de asesoría gratuita en anticoncepción que brinda la oportunidad de conocer cada método, su mecanismo de acción y despejar las dudas que surgen alrededor de este tema.

¿Qué opciones en anticoncepción existen?

Desde la ciencia resultan recomendables y seguros los métodos anticonceptivos modernos, que han sido creados en laboratorios a partir de la investigación científica. Entre estos se encuentran los hormonales, los de barrera, el dispositivo intrauterino y los métodos definitivos.

Los hormonales como la píldora, la inyección, el implante subdérmico, el anillo vaginal y el parche, inhiben la ovulación y hacen más grueso el moco del cuello del útero para que no

pasen los espermatozoides. En el caso de los métodos de barrera, actúan como tal y no permiten que el espermatozoide llegue a fecundar el óvulo. Es preciso aclarar que los hormonales, ofrecen una efectividad del 98% mientras que los de barrera alcanzan una efectividad del 85% al 93% si se usan correctamente.

Es importante señalar que las mujeres en estado gestante, que sean diagnosticadas con el virus del Zika, tienen la opción de interrumpir de manera legal y voluntaria su embarazo. En este caso, las mujeres pueden acceder a la interrupción del embarazo si llegasen a existir riesgos para su salud. Lo anterior, hace referencia a una de las causales de riesgo argumentadas en la sentencia C- 355/06 de la Corte Constitucional. Por lo tanto, el sistema General de Seguridad de Social en Salud debe garantizarle a las mujeres información veraz y oportuna sobre sus opciones y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, si así lo deciden.

Profamilia cuenta con un programa integral en Interrupción Voluntaria del Embarazo o aborto seguro, que ofrece información y servicios médicos para que las mujeres puedan tomar su decisión de manera personal, informada y autónoma. Este programa tiene como punto de partida la asesoría psicológica en opciones, donde se ofrecen las diferentes alternativas frente a cada situación, exponiendo los factores, riesgos y requisitos de cada una de ellas.

Información de prensa

Andrés Felipe Ruiz

Analista de comunicaciones - Profamilia.

Tel. (1) 3390900 Ext. 166

Cel. 3003311709

andres.ruiz@profamilia.org.co

Luz Helena Sánchez Acuña

Coordinadora comunicaciones - Profamilia.

Tel. (1) 3390900 Ext. 233

Cel. 3134640747

comunicaciones@profamilia.org.co