

# MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE ALTA EFICACIA POSTERIOR A LA IVE

---



# AUTORES



**Laura González Pérez**

Médica General



**Laura Jaramillo  
Espinosa**

Médica General

# AUTORES



**Daniela Estrada Plata**

Médica General



**Fernando Ruíz Vallejo**

Doctor en Demografía,  
Sociólogo

# TABLA DE CONTENIDO



**01** ANTECEDENTES

**02** METODOLOGÍA

**03** RESULTADOS

**04** DISCUSIÓN Y  
CONCLUSIONES

01

# ANTECEDENTES

---




# EN EL MUNDO




Embarazos no  
deseados



Embarazos no  
deseados que  
terminan en IVE



22 millones abortos  
inseguros al año




Aborto seguro



Latinoamérica y el  
Caribe: 56%  
embarazos no  
deseados

# EN COLOMBIA

---



Embarazos no  
planeados




Sentencia C - 355  
de 2006



400.000 abortos al  
año

# IVE Y ANTICONCEPCIÓN


---



NO usa ningún método anticonceptivo




Educación en métodos anticonceptivos



Ovulación y relaciones sexuales


# IVE Y ANTICONCEPCIÓN+

---




**74%**

**Métodos de alta  
efectividad**



**9%**

**ISD Y DIU**



**21%**

**Píldoras,  
inyectables,  
parche o anillo**


# OBJETIVOS

---

Identificar las variables que se correlacionen con la elección de las usuarias frente a métodos anticonceptivos de media-alta y alta eficacia, posterior a la interrupción del embarazo



Conocer las variables poblacionales que nos permitan dar una atención personalizada



# 02

## METODOLOGÍA

# METODOLOGÍA

---



Cross sectional



13.067 registros de historias clínicas



Profamilia Antioquia



2015 - 2020



15-45 años  
EG < 15 semanas  
Causal salud



03

**RESULTADOS**

---

# VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

---

**25,9**

Edad media

**72,5%**

Soltera

**84,5%**

Estrato 2 y 3

**62,9%**

Educación secundaria

# VARIABLES GINECOLÓGICAS

Antecedentes ginecológicos			
<i>Edad media a la menarquia</i>			
Edad de la menarquia	12813,00	12,70	1,60
<i>Edad media de la primera relación sexual</i>			
Edad de la primera relación sexual	12371,00	16,40	2,20
<i>Número medio de nacidos vivos</i>			
Ninguno	6077,00	46,50	
Uno	4113,00	31,50	
Dos	1756,00	13,40	
Tres o más	896,00	6,90	

*Fuente: estadísticas de servicios Profamilia, Antioquia, 2015-2020*

# VARIABLES IVE

## *Edad gestacional media (semanas)*

	13313	7,80	2,30
--	-------	------	------

## *Orden de la IVE en el periodo observado*

Única	12842	96,50
-------	-------	-------

Segunda	439	3,30
---------	-----	------

Tercera o más	32	0,20
---------------	----	------

## *Número de abortos previos (previos y en el periodo de observación)*

Ninguno	11257	84,60
---------	-------	-------

Uno	1769	13,30
-----	------	-------

Dos	218	1,60
-----	-----	------

Tres o más	69	0,50
------------	----	------

## *Sufre violencia*

No	12868	96,70
----	-------	-------

Sí	445	3,30
----	-----	------

# VARIABLES ANTICONCEPTIVOS

## *Efectividad método anticonceptivo antes de la IVE*

Alta	376	2,80
Media-Alta	3521	26,40
Baja	1597	12,00
Ninguna (no usaba)	7819	58,70


## *Efectividad método anticonceptivo a partir de la IVE*

Alta	9085	68,20
Media-Alta	3934	29,60
Baja	195	1,50
Ninguna (no usaba)	99	0,70

*Fuente: estadísticas de servicios Profamilia, Antioquia, 2015-2020*

# ANÁLISIS: IVE – ANTICONCEPCIÓN

---



# ANÁLISIS: IVE – ANTICONCEPCIÓN


---

**1,5%**

**BAJA EFECTIVIDAD**

**0,7%**


**NINGÚN MÉTODO**



# ANÁLISIS: IVE – ANTICONCEPCIÓN

Tabla 5. MODELOS DE REGRESIÓN

Variables	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
<i>Tipo de método previo IVE (ref: DIU)</i>			
Anillo vaginal/parche	0,53	0,59	0,69
Anticonceptivo oral	0,71	0,66	0,71
Esterilización	1,04	0,96	1,03
Implante subdérmico	0,92	0,84	0,72
Inyectable	1,06	0,92	0,94
Otro método	7,22	6,31	6,14
Preservativo	11,62	11,53	12,97
Ninguno	12,35	11,48	12,75





# ANÁLISIS: IVE – ANTICONCEPCIÓN

---

Tabla 5. MODELOS DE REGRESIÓN

Variables	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
<i>Lugar de nacimiento (ref: Colombia)</i>			
Venezuela			4,04
Otro			1,09
<i>Régimen Seguridad social (ref: ninguno)</i>			
Contributivo			1,78
Subsidiado			1,98
<i>Edad actual</i>			
			0,95





04<sup>✦</sup>


# DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

---

CUANDO NO SE RECIBE  
UNA ASESORÍA EN  
PLANIFICACIÓN FAMILIAR  
DESPUÉS DE LA IVE, SE  
TIENE CASI **EL DOBLE** DE  
RIESGO DE PRESENTAR  
NUEVAMENTE UN  
EMBARAZO NO DESEADO  
EN LOS SIGUIENTES **12**  
**MESES**




TODAVÍA EXISTEN  
LUGARES DONDE LAS  
PACIENTES A PESAR DE  
HABERSE REALIZADO  
UNA IVE, CONTINÚAN SU  
VIDA SIN INICIAR NINGÚN  
MÉTODO DE  
PLANIFICACIÓN FAMILIAR



# EDUCACIÓN Y ASESORÍA

---



# YOUR BODY, YOUR CHOICES

